

ankle, or dorsum of foot) that meets the following criteria: ≥ 2 weeks' and < 6 months' duration at screening and $> 2 \text{ cm}^2$ in area before randomization. After a 2-week run-in period, participants are randomized 1:1 to receive once-daily oral voxelotor 1500 mg or placebo in addition to SOC for 12 weeks. After the randomized treatment period, all participants enter an open-label treatment period and receive voxelotor 1500 mg plus SOC for an additional 12 weeks. Participants will have the option to enroll in a separate open-label extension study after completing the 24-week treatment period. All study sites in Brazil will be activated by the end of 2022, with the first patient evaluation in Brazil anticipated to occur in the first week of December 2022. **Results:** The primary objective of this study—to assess the efficacy of voxelotor plus SOC compared with placebo plus SOC in healing leg ulcers—is measured by the proportion of patients with resolution of target ulcer(s) in each treatment group by week 12. Key secondary endpoints include days to resolution of target ulcer(s) up to week 12, change from baseline in total surface area of target ulcer(s) at week 12, and incidence of new ulcers by week 12. Exploratory analyses include correlation of target ulcer(s) healing with change in hemoglobin and hemolytic parameters. The study will also assess patient-reported outcome measures, including health-related quality of life and pain. **Discussion:** Findings from a post hoc analysis of participants with leg ulcers in the HOPE trial suggest that voxelotor may be an effective treatment for leg ulcers in patients with SCD. Voxelotor directly targets the underlying mechanism of disease (namely HbS polymerization) and may have a therapeutic effect on the clinical complications of SCD associated with anemia and hemolysis, including leg ulcers. **Conclusion:** Results from this study will advance our understanding of the potential effects of voxelotor on leg ulcers in patients with SCD in global populations.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2022.09.048>

ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE E OS DESAFIOS TRANSFUSIONAIS ASSOCIADOS: RELATO DE CASO

JAR Neto ^a, AA Pedrão ^a, CGS Nogueira ^a,
BRMC Curta ^a, EFGD Santos ^b, ENP Florentino ^b,
PMN Teixeira ^b, JCI Gazola ^b

^a Departamento de Clínica Médica, Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos (SCO), Ourinhos, SP, Brasil

^b Agência Transfusional, Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos (SCO), Ourinhos, SP, Brasil

Introdução: A anemia hemolítica autoimune (AHAI) é uma doença adquirida com produção de autoanticorpos que se ligam à superfície dos eritrócitos causando hemólise intra ou extravascular. **Objetivos:** Relatar um caso de Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI), trazendo para a discussão o diagnóstico, terapêutica, evolução e relevância. **Metodologia e desenvolvimento:** Análise de prontuário médico hospitalar. Apresentação do caso: Paciente S.E.P., masculino, 40 anos, trabalhador rural, iniciou quadro de dispneia a

mínimos esforços, astenia progressiva e icterícia durando cerca de 10 dias. Procurou cardiologista em atendimento ambulatorial, realizou hemograma evidenciando anemia microcítica e normocromica acentuada HB 5,6 sendo encaminhado a serviço de urgência. Paciente nega sintomas antecedendo quadro, negava sangramentos, negava melena, negava diagnóstico prévio de anemia, fazia uso diário de dipirona devido lombalgia crônica cerca de 4 g/dia há 3 anos, e losartan 50 mg/dia devido hipertensão arterial sistêmica há mais de 5 anos. Admitido mal perfundido, hipotenso, taquicárdico, taquidispneico, com HB em queda progressiva, COOMBS direto positivo, LDH elevado, reticulócitos normais e sorologias para hepatites virais negativas. Iniciado corticoterapia com prednisona 100 mg/dia por 5 dias, ácido fólico e vitamina C, sem resposta, HB em 2,8. Iniciada imunoglobulina 0,4 g/dia e pulsoterapia com metilprednisolona 1 g/dia. Aos testes imunohematológicos, tipagem ABO/Rh: A negativo, D fraco negativo; Teste de Antiglobulina Direto (TAD) positivo em soro mono e poliespecífico (IgG e IgG+C3d); Teste de autoanticorpos positivo em fase salina e AGH; Pesquisa de anticorpos irregulares e Provas cruzadas positivas, indicando incompatibilidade. Foi realizada a infusão de uma unidade de Concentrado de hemácias (A RhD negativo) como medida de extrema urgência pela gravidade da anemia e do quadro clínico do paciente. Paciente pós transferência ao serviço de referência necessitou de mais transfusões mesmo com as provas incompatíveis e foram identificados autoanticorpos da classe IgG e IgM. Paciente recebeu alta médica e encaminhamento para acompanhamento ambulatorial. **Discussão e conclusão:** A AHAI ocorre pela destruição imunomediada precoce das hemácias, via fixação de imunoglobulinas e/ou complemento na superfície de sua membrana. As causas dessa doença podem ser primária/idiopática ou secundária a doenças ou uso de medicações, podendo ocorrer pela presença de autoanticorpos quentes, frios ou, raramente, por ambos. O tratamento precoce com imunossupressão deve ser empregado quando os pacientes apresentarem crise hemolítica e anemia. A grande complexidade de classificar a AHAI está envolvida com sua reatividade diante de testes laboratoriais ofertados hoje, apesar de surgirem novos meios, os exames imunohematológicos dão suporte ao quadro suspeito, porém, ainda existe a necessidade de testes mais baratos com maior sensibilidade para o tipo de reação, tendo em vista que a metodologia em gel seria a mais segura a ser aplicada, todavia é a de mais alto custo.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2022.09.049>

PERSPECTIVAS DOS MÉDICOS BRASILEIROS SOBRE A DOENÇA FALCIFORME E SEU TRATAMENTO: RESULTADOS DA PESQUISA DE CONHECIMENTO, PERSPECTIVAS E EXPERIÊNCIAS EM SAÚDE DA DOENÇA FALCIFORME (SICKLE CELL HEALTH AWARENESS, PERSPECTIVES AND EXPERIENCES, SHAPE)

FF Costa ^a, M Montalembert ^b, A Anderson ^c,
W Jastaniah ^d, JB Kunz ^e, I Odame ^f,

A Beaubrun^g, F Montealegre-Golcher^g,
B Lartey^h, BPD Inusaⁱ

^a Centro de Hematologia e Hemoterapia, Faculdade de Medicina, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brasil

^b Department of Pediatrics, Necker-Enfants Malades Hospital, Paris, France

^c PRISMA Health Comprehensive SCD Program, University of South Carolina School of Medicine, Columbia, United States

^d King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Riyadh, Saudi Arabia

^e Department of Pediatric Oncology, Hematology and Immunology, Hopp Children's Cancer Center (KiTZ), Heidelberg, Germany

^f Department of Hematology/Oncology, The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada

^g Global Blood Therapeutics

^h Ipsos Healthcare, Hong Kong, China

ⁱ Department of Paediatric Haematology, Evelina London Children's Hospital, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, London, United Kingdom

Objetivos: A doença falciforme (DF) é um distúrbio genético que tem um impacto substancial no bem-estar físico e mental dos pacientes. Embora pesquisas sobre a melhora da qualidade de vida e dos resultados para pacientes com DF tenham aumentado, também é importante entender as perspectivas dos médicos que tratam de tais pacientes. A pesquisa SHAPE é uma pesquisa on-line multinacional e quantitativa que examina o impacto da DF em pacientes e cuidadores, bem como as perspectivas dos médicos que tratam estes pacientes. Este relatório examina a experiência dos médicos no Brasil, no contexto de percepções globais. **Materiais e métodos:** Médicos (hematologistas, onco-hematologistas, hematologistas pediátricos, pediatras, clínicos e clínicos gerais ou médicos de família) nos EUA, Alemanha, Brasil, França, Reino Unido, Canadá, Arábia Saudita e EAU responderam a perguntas fechadas sobre suas experiências no tratamento de pacientes com DF. Médicos com 3 a 35 anos de prática com 10 ou mais pacientes com DF sob seus cuidados eram elegíveis. **Resultados:** Dos 219 médicos entrevistados, 31 eram do Brasil. Os médicos brasileiros tinham, atualmente, uma média de 25 pacientes sob seus cuidados e uma média de 13 anos de experiência no tratamento de pacientes com DF. Para pacientes com idade ≤ 11 anos, os médicos brasileiros identificaram redução do apetite (68%) como o sintoma mais frequentemente relatado, enquanto todos os médicos identificaram dor por CVO (crise vaso-oclusiva) (63%) como o sintoma mais comumente relatado pelos pacientes. Em comparação com o grupo de todos os médicos, os médicos brasileiros reconheceram um maior impacto da DF na autoestima de pacientes jovens (idade entre 12 e 17 anos) (85% vs. 52% do total) e na saúde mental (69% vs. 45% do total). Os médicos brasileiros também relataram uma porcentagem maior de pacientes tratados com hidroxiureia/hidroxycarbamida (57% vs. 43% no total) e uma porcentagem menor considerou a terapia de transfusão de eritrócitos como último recurso (32% vs.

54% no total). Mais médicos brasileiros estavam otimistas de que os tratamentos futuros reduziram tanto a fadiga (68% vs. 46% no total) quanto as dores ósseas/rigidez articular (60% vs. 39% no total). Consistentemente com o grupo de todos os médicos, os médicos brasileiros acreditam que o tratamento da hemólise e anemia pode melhorar a maioria dos aspectos da DF, inclusive a redução do dano ao órgão alvo (81% vs. 84% total). **Discussão:** Em contraste com o grupo de todos os médicos entrevistados, os médicos brasileiros reconheceram a perda de apetite como o sintoma mais frequentemente relatado por pacientes com idade ≤ 11 anos e observaram um maior impacto da DF no bem-estar emocional de pacientes com idade entre 12 e 17 anos. Estes achados ressaltam a potencial necessidade de um foco direcionado aos sintomas da DF e no tratamento da doença em diversas faixas etárias de pacientes no Brasil. A pesquisa também mostrou que, em comparação com o grupo de todos os médicos, uma porcentagem maior de médicos brasileiros estava otimista de que tratamentos futuros reduziram a fadiga e as dores ósseas/rigidez articular, sugerindo que os tratamentos atualmente disponíveis para eles não abordam esses sintomas de forma satisfatória. **Conclusão:** Os achados da pesquisa destacam experiências e percepções dos médicos específicas do Brasil que podem ser usadas para ajudar e informar os médicos sobre abordagens de controle de sintomas direcionadas e a implementação de tratamentos eficazes.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2022.09.050>

DESENVOLVIMENTO DE MAPAS CONCEITUAIS INTERATIVOS COMO METODOLOGIA DE ENSINO MULTIPROFISSIONAL EM ANEMIAS

VS Silva^{a,b}, MR Oliveira^a, LO Sales^a,
FP Mesquita^{a,b}, ECE Silva^{a,b}, ML Braga^a,
LGDS Costa^a, JKC Ribeiro^{a,b}

^a Instituto Pró-Hemo Saúde (IPH), Fortaleza, CE, Brasil

^b Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), Fortaleza, CE, Brasil

Objetivo: Construir mapas conceituais interativos, digitais e dinâmicos, que propiciem o ensino e aprendizagem imersivo na temática de anemias. **Material e método:** A pesquisa de caráter descritiva, qualiquantitativa, documental e bibliográfica fundamentou-se em propor uma metodologia interativa original que desenvolvesse mapas conceituais de anemias com uso de ferramentas digitais, para a esfera multiprofissional em saúde. Para atingir os objetivos propostos, realizou-se a construção de quatro mapas conceituais, utilizando o programa Cmap Tools ferramenta de uso on-line e gratuito. **Resultados:** Desta forma os mapas conceituais elaborados possuem as temáticas: Mapa geral das Anemias, Anemias hemolíticas, Hemoglobinopatias e Anemias carências. Os mapas conceituais abordaram conceito, fisiopatologia, etiologia, achado clínicos, achados laboratoriais, diagnóstico e tratamento, trazendo de forma interativa e diferenciada diagramas ilustrativos, que foram hospedados em nuvem no domínio <http://prohemo.org.br/?page=mapas> após o trabalho