

RELATO DE CASO: HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS

AC Griciunas, DEG Camargo, LMAD Santos,
IAA Barcessat, PR Criado, VAQ Mauad,
DMM Borducchi

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
André, SP, Brasil

Introdução: Histiocitose de células de Langerhans (HCL) é uma neoplasia rara, com maior prevalente na infância e com incidência em adultos de 1:1.000.000 com idade mediana de 34 anos. A proliferação clonal de células dendríticas leva a uma infiltração local ou difusa em órgãos. Possui apresentação clínica heterogênea, lesões são mais comum em pele e ossos, podendo se manifestar em outros órgãos como pulmões, fígado, medula óssea e órgão endocrinológicos. Lesões cutâneas podem ser difusas, lesões papulo-vesiculosas ou dermatite seborreica-símile. O diagnóstico é realizado por biopsia com anatomopatológico demonstrando células de Langerhans (CL) e perfil imunohistoquímico presentes CD1a, CD207 e S-100 na superfície das células. 60% dos casos podem ter a mutação no gene V600E-BRAF. **Objetivos:** Apresentar um caso de HCL com acometimento cutâneo e recidivado após a primeira linha de tratamento, discutir novas possibilidades de tratamento a partir da fisiopatologia da doença. **Caso clínico:** Paciente V.A.G.R, sexo masculino, 53 anos, sem comorbidades, referia quadro de lesões cutâneas em região de couro cabeludo, intertriginosas em virilhas e região interglútea, tronco e membros inferiores com evolução há 4 anos. As lesões possuíam característica erosiva associado a presença de exudato seropurulento. Devido a secreção de lesões em grande quantidade, no momento paciente possuía importante prejuízo social com necessidade do uso de fraudas e compressas em locais acometidos. Realizado duas biopsias de pele, uma delas apresentou análise histológica compatível com proliferação histiocitária e imunofenotipagem positiva para AE1/AE3, CD1a, CD45 LCA parcial, CD68, Ki-67 80%, Proteína S-100. Pesquisa de mutação BRAFV600E negativa. Demais exames para estadiamento da doença demonstrou ausência de outros órgãos acometidos. Submetido a tratamento quimioterápico com ARA-C 100 mg/m² D1-D5 a cada 28 dias, realizado 12 ciclos, com controle parcial da doença. Após 7 meses do término de tratamento, apresentou recidiva da doença com piora das lesões cutâneas. Optado então por nova terapia com uso de hidroxiureia (HU), dose máxima alcançada 1.500 mg/dia. Após início do tratamento, paciente apresenta regressão importante de lesões cutâneas, toxicidade tolerada e importante ganho na qualidade de vida. **Discussão:** Não há um consenso para o manejo de HCL, estudos sugerem o uso de vimblastina e prednisona ou citarabina, como possibilidade de primeira linha de tratamento. Dado que as CDs surgem a partir de células precursoras mieloides, dando origem as CLs, terapias dirigidas contra células mieloides podem ser eficazes no tratamento da doença. A Hidroxiureia bloqueia a síntese de DNA de células mieloides pela inibição da ribonucleotídeo redutase, sendo eficaz em neoplasias de origem mielóide. Em um estudo de coorte realizado em Hospital Texas Children's, 15 pacientes foram selecionados com doença cutânea ou óssea refratária a

primeira linha de tratamento. Os doentes foram tratados com HU dose máxima tolerada. Foi demonstrado que 80% dos pacientes tiveram resposta a exposição a HU (53% resposta completa e 27% resposta parcial). **Conclusão:** O manejo da HCL na atualidade ainda é um desafio e carece de estudos clínicos que demonstrem maiores níveis de evidência no seu tratamento. A HU possui o benefício de baixo custo, facilidade de administração e efeitos adversos bem estabelecidos, podendo revelar-se um método seguro e uma opção terapêutica eficaz para o controle da doença apresentada.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2023.09.308>

ESTUDO DE PREVALÊNCIA DE ESPÉCIES NA HEMOCULTURA DE PACIENTES ONCOHEMATOLÓGICOS DE UMA UNIDADE TERCIÁRIA DE SAÚDE DO CEARÁ

LCC Temoteo^a, GS Lopes^b, VA Lavor^a,
WLA Costa^a, JFC Sampaio^a, IGB Rocha^a,
JL Vasconcelos^a, MM Maciel^a

^a Universidade Estadual do Ceará (UECE),
Fortaleza, CE, Brasil

^b Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), Fortaleza,
CE, Brasil

Objetivos: Destacar as espécies de microrganismos mais prevalentes nas amostras de hemocultura de pacientes oncohematológicos admitidos numa Unidade Terciária de Atendimento (HGCC) em dois anos. **Materiais e métodos:** O presente estudo de prevalência, de caráter transversal observacional e analítico, delimitou o espaço temporal de dois anos (01/08/2021 à 19/06/23) para analisar e pontuar as espécies mais representativas na hemocultura dos pacientes da unidade hematológica acometidos com linfomas, leucemias, mielodisplasias e outras patologias oncohematológicas. Os dados empregados nesta pesquisa foram obtidos por meio de uma revisão dos resultados de amostra de hemocultura, estratificados e distribuídos por frequência em tabela da Unidade Terciária de Atendimento (HGCC) em Fortaleza, CE. **Resultados:** De um total de 115 amostras isoladas positivas de hemocultura, analisando o perfil dos microrganismos com maior frequência, sobressaíram-se a *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus epidermidis* e *Staphylococcus aureus* com, respectivamente, 31 (26.96%), 15 (13.04%) e 10 (8.70%) amostras identificadas. Somente essas três espécies bacterianas constituíram cerca de metade (48.70%) das amostras analisadas, demonstrando importante prevalência na unidade alvo do estudo. Além dessas, seguindo a ordem de frequência das amostras estavam: *Escherichia coli* (9), *Staphylococcus haemolyticus* (8), *Staphylococcus capitis* (7), *Chryseobacterium indologenes* (6), *Staphylococcus hominis* (6), *Pseudomonas aeruginosa* (5), *Staphylococcus warneri* (3), *Stenotrophomonas maltophilia* (3), *Acinetobacter baumannii* (2), *Candida krusei* (2), *Enterococcus faecium* (2), *Klebsiella aerogenes* (2), *Acinetobacter baumannii complex* (1), *Candida tropicalis* (1), *Enterobacter cloacae* (1) e *Pseudomonas fluorescens* (1). **Discussão:** Quadros infecciosos configuram uma das complicações mais graves e comuns de pacientes oncohematológicos e representam um desafio para a prática clínica.

Esses pacientes possuem uma suscetibilidade a infecções oportunistas tanto pela condição de hiperproliferação clonal, redução na produção de leucócitos, eritrócitos ou plaquetas, quanto pela exposição a antineoplásicos (quimioterapia), elevando o risco de bacteremia e desfechos fatais. As infecções interferem na qualidade de vida dos pacientes, atrasam e, por vezes, interrompem o tratamento quimioterápico. A nível de classificação por coloração Gram, ao avaliar as amostras de hemocultura dos pacientes sob cuidados hemoterápicos do HGCC, infere-se que das dezenove espécies microbianas totais, dez pertencem ao grupo de bactérias gram-negativas e sete às bactérias gram-positivas. Além disso, dentre as gram-negativas encontradas convém destacar a frequência da *Klebsiella pneumoniae*, que configura um patógeno oportunista e coloniza indivíduos imunocomprometidos, hospitalizados e que apresentam sérias doenças de base, caso bem típico de pacientes hematológicos avançando com neutropenia febril ou outra complicação típica do quadro. Fica exposto também que somente dois encaixam-se como espécies fúngicas (*Candida krusei* e *Candida tropicalis*), presentes em 3 amostras totais. **Conclusão:** É necessário ampliar o campo de pesquisas infecciosas no setor Oncohematológico, a fim de tornar possível a antecipação de medidas terapêuticas, o impedimento de desfechos clínicos graves e fatais, além do avanço do prognóstico de pacientes imunocomprometidos.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2023.09.309>

CUIDADOS PALIATIVOS

CUIDADOS PALIATIVOS EM HEMATOLOGIA: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SERVIÇO PÚBLICO DE SÃO PAULO

MDS Pastori^{a,b}, RS Pastori^b, MEG Queiroz^{b,c},
LLM Perobelli^a, RT Carvalho^{b,c}

^a Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus
Zerbini - Hospital Brigadeiro, São Paulo, SP, Brasil

^b Instituto Paliar, São Paulo, SP, Brasil

^c Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A Medicina Paliativa propicia cuidado aos pacientes com doenças graves e ameaçadoras da vida. As doenças oncohematológicas apresentam um perfil de gravidade e morbidade com padrões heterogêneos. **Objetivo:** Determinar a percepção sobre cuidados paliativos (CP) dos profissionais da saúde em um serviço de hematologia de hospital público terciário em São Paulo. **Métodos:** Estudo observacional transversal quantitativo, com pesquisa descritiva e analítica dos dados. A identificação dos participantes foi feita através de entrevistas com aplicação de questionário à equipe assistencial através de formulário impresso. **Resultados:** A população foi composta 46 profissionais, 50,0% tem idade na faixa 25-35 anos e a maioria é do sexo feminino (76,1%). Quanto à profissão, 37% são médicos, 37% enfermeiros, 4,3% fisioterapeutas, 4,3% fonoaudiólogos, 4,3% nutricionistas, 4,3% de técnicos de enfermagem, 2,2% psicólogos, 2,2% odontologistas, 2,2% assistente social e 2,2% farmacêuticos.

Quanto à religião, 47,8% dos profissionais são católicos e 13% declararam-se sem religião. A faixa do tempo de formação com mais profissionais é a de menos de 5 anos (43,5%) e apenas 10,9% têm formação em CP. Consideram-se aptos à prática de CP 82,2% dos profissionais, entre esses, 96% conhecem a definição de CP da OMS ($p=0,016$), contudo apenas 40% conhecem a definição de Dor Total proferida por Cicely Saunders ($p=0,041$). Detectou-se que 94,1% dos profissionais médicos e 70% dos enfermeiros compreendem que CP podem ser associados com cuidados curativos, enquanto apenas 50% dos outros profissionais possuem esse entendimento ($p=0,011$). Em relação à comunicação em CP, a maior dificuldade apontada na transmissão de más notícias foi a falta de treinamento adequado. Em segundo lugar para os médicos, foi a falta de tempo, e para os enfermeiros, o medo da reação do paciente. Na fase final de vida, 80,4% dos entrevistados consideram que os pacientes devem ser informados sobre seu prognóstico. Em relação aos opioides, identifica-se que a maior resistência à sua prescrição está relacionada ao medo da depressão respiratória; seguida pelo receio de ser um abreviador da vida e promover dependência química. A indicação de uma via alternativa de alimentação foi considerada oportuna por 39% dos profissionais, mesmo em pacientes em fase final de vida. Em relação à retirada e não introdução de procedimentos invasivos, 80,4% dos entrevistados compreendem que é permitido, ética e legalmente, suspender ou não empreender tratamentos que prolonguem a vida de pacientes com doenças graves sem possibilidades de tratamento modificador. Não compreendem que o atendimento aos familiares enlutados faz parte da assistência paliativista 17,4%. **Discussão:** A maioria dos profissionais tem conhecimento dos princípios e praticam atitudes paliativistas, contudo, destaca-se que apesar de considerarem-se aptos à prática, os CP não estão inseridos em boa parte da formação dos profissionais da saúde, resultando em percepções equivocadas sobre terminalidade, Dor Total e uso de opioides, além de dificuldade de comunicação e uma não abordagem biopsicossocial e espiritual. **Conclusão:** A ampla dimensão dos aspectos teóricos e práticos dos cuidados paliativos exige treinamento específico. A necessidade de ampliação da capacitação e desenvolvimento de equipes com formação em cuidados paliativos é uma demanda atual.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2023.09.310>

A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS PALIATIVOS NA HEMATOLOGIA: PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DOENÇAS HEMATOLÓGICAS

ABC Hidalgo, MSS Pereira

Universidade Municipal de São Caetano do Sul
(USCS), Itapetininga, SP, Brasil

Objetivo: O objetivo deste estudo é discutir a importância dos cuidados paliativos na hematologia, destacando como essa abordagem pode proporcionar ao paciente um tratamento individualizado e conseqüentemente gerar uma melhor qualidade de vida para pacientes com doenças hematológicas.