

esperada, uma vez que tais modalidades são o principal foco das diretrizes de exercício para indivíduos saudáveis; portanto, é lógico que os estudos busquem adaptar essas recomendações às pessoas com hemofilia. São necessários protocolos que incorporem modalidades sensório-motoras para abordar os déficits proprioceptivos e reduzir o risco de lesões nessa população. Os *storyboards* de exercícios foram inovadores, não existindo precedentes para esta tecnologia educacional na literatura, demonstraram evidências de validade de conteúdo e podem ser utilizados na prática clínica para guiar a elaboração de programas de exercícios para adultos com hemofilia, com potencial de ampliar o acesso à prática segura de atividade física, bem como de oferecer uma ferramenta para auxiliar profissionais de saúde a prescreverem com mais segurança e confiança.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2025.105213>

ID - 2949

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 'NUTRIÇÃO DESEQUILIBRADA: MENOR QUE AS NECESSIDADES CORPORAIS' E A UTILIZAÇÃO DE SONDA NASOENTERAL EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS À TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS AUTÓLOGO

AE Bom, MC da Silva, SR Kuntz, MN do Amaral, VRK Hoffmann, IN Silva, ROS Viegas

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, RS, Brasil

Introdução: O transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) no paciente pediátrico pode provocar diversas alterações gastrintestinais devido à alta toxicidade relacionada à fase do condicionamento. Tais alterações causam prejuízos na absorção dos nutrientes e no aporte nutricional, podendo resultar na piora do estado nutricional da criança. Na ausência da toxicidade grave do trato gastrintestinal, a alimentação enteral tem sido amplamente indicada para pacientes pediátricos submetidos ao TCTH, tendo a sonda nasointestinal (SNE) a via preferencial. A identificação precoce da nutrição desequilibrada e a indicação da utilização da SNE é uma importante ferramenta para o cuidado da criança submetida ao TCTH autólogo. **Objetivos:** Identificar a utilização do diagnóstico de enfermagem (DE) "Nutrição Desequilibrada: menor que as necessidades corporais" e a utilização da dieta via SNE em pacientes pediátricos submetidos ao TCTH autólogo. **Material e métodos:** Trata-se de estudo descritivo, com relato de experiência de enfermeiras de um hospital universitário do sul do país, com avaliação dos TCTH Autólogos pediátricos, de maio de 2024 a maio de 2025, em uma unidade de oncologia pediátrica. **Resultados:** No período analisado, foram realizados nove TCTH autólogos pediátricos. A idade dos pacientes variou entre 1 e 14 anos. O DE 'Nutrição Desequilibrada: menor que as necessidades corporais' foi utilizado para cinco pacientes. Já a SNE foi utilizada para dieta por oito pacientes e o único que não a utilizou, possuía gastrostomia.

Discussão: Os dados encontrados neste estudo reforçam a relevância do DE "Nutrição Desequilibrada: menor que as necessidades corporais" no cuidado de pacientes pediátricos submetidos ao TCTH Autólogo. O fato de mais da metade dos pacientes (5 de 9) terem apresentado este diagnóstico evidencia o impacto significativo que o regime de quimioterapia em altas doses tem sobre o estado nutricional dessas crianças, frequentemente levando à inapetência, mucosite, náuseas, vômitos e outras complicações gastrointestinais. A utilização da SNE em oito dos nove pacientes demonstra que, mesmo diante de estratégias para manter a alimentação oral, há necessidade frequente de suporte nutricional invasivo para garantir a oferta calórica e proteica mínima necessária para a recuperação hematopoética e para a manutenção das funções vitais. A exceção – um paciente com gastrostomia – confirma que, independentemente da via, o suporte nutricional é uma necessidade quase universal nesse perfil de pacientes. **Conclusão:** Esses achados ressaltam a importância da atuação precoce e multiprofissional no manejo nutricional de crianças em TCTH, especialmente o papel da enfermagem na identificação do DE de nutrição desequilibrada e na implementação e monitoramento da dieta por via enteral. A vigilância constante, o uso de escalas de avaliação nutricional, e a comunicação eficaz entre os profissionais de enfermagem, nutrição e medicina são essenciais para minimizar perdas ponderais, reduzir complicações infecciosas e promover melhores desfechos clínicos.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2025.105214>

ID - 2895

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM MAIS PREVALENTES EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS AUTÓLOGO NO ANO DE 2024 EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO SUL DO BRASIL

AE Bom, MC da Silva, SR Kuntz, MN do Amaral, VRK Hoffmann, IN Silva, ROS Viegas

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, RS, Brasil

Introdução: O transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) autólogo é um tipo de procedimento em que é eliminado o sistema hematopoiético e imune do paciente através da infusão de quimioterápicos em alta dose, e posteriormente, substituído por uma porção de células-tronco pluripotentes previamente coletadas do próprio paciente. Os diagnósticos de enfermagem (DE) estabelecidos nesse contexto, servem como ferramentas úteis para guiar o raciocínio clínico e a tomada de decisão, qualificando a assistência prestada. Eles formam a base para a seleção de intervenções de enfermagem. Os DE de risco representam um potencial para deteriorar, ou seja, demonstram a suscetibilidade de um indivíduo de desenvolver uma resposta humana indesejável à condição de saúde. **Objetivos:** Identificar os DE mais prevalentes utilizados no TCTH autólogo em Pediatria. **Material e**